


DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND



Estos datos fueron proporcionados por el CDC y están actualizados a partir de mayo de 2017. Sin embargo, el NIH estima que entre 1 y 100, y 1 y 10.000 personas tienen la enfermedad de von Willebrand (VWD), y que a menudo es subdiagnosticada. * La mayoría está de acuerdo en que vWD es el trastorno de sangrado genético más común y muchos no acuden a los Centros de Tratamiento de Hemofilia para recibir atención.

Distribución geográfica de las personas con enfermedad de von Willebrand que asisten a Centros de Tratamiento de Hemofilia de Cuidado Integral financiados con fondos federales por estado de residencia, 1 / 2012-12 / 2016



Nota: Este mapa presenta el número de personas que asistieron a los centros de tratamiento de hemofilia durante el período 1/1 / 2012-12 / 31/2016 y que participaron en el Perfil de Población de HTC (<http://www.cdc.gov/ncbddd/hemophilia/communitycounts/about.html>) a partir del 31/12/2016. Los individuos se cuentan sólo una vez, independientemente del número de veces que asistieron a un HTC durante este período.

*<http://ghr.nlm.nih.gov/condition/von-willebrand-disease>